La toxoplasmosis ocular es una enfermedad retinal que se produce por la infección con el parásito Toxoplasma gondii que generalmente se trasmite a través de las heces de los gatos contaminados, pudiendo ocurrir por diferentes vías desde alimentos contaminados hasta ingesta de carnes contaminadas.

Puede ser congénita o adquirida.

En el primer caso, si ocurre en el primer trimestre del embarazo puede conducir al aborto. Mas tardíamente en el tercer trimestre puede conllevar a microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, convulsiones y lesiones bilaterales de la retina con pérdida variable de la **agudeza visual**.

En las adquiridas, se puede producir una inflamación a nivel intraocular con **ojo** rojo, molestias con la luz y pérdida variable de la visión.

Una vez que se producen las cicatrices la pérdida visual es poco probable que se recupere. En los procesos agudos con inflamación, dolor, ojo rojo y visión borrosa es importante el tratamiento con medicamentos específicos y anti-inflamatorios para reducir el daño ocasionado.

Imágenes de Toxoplasmosis Ocular




Foto 1 – Toxoplasmosis Ocular – Enfermedades infeccionas de la retina – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria



Foto 2 – Toxoplasmosis Ocular – Enfermedades infeccionas de la retina – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria




Foto 3 – Toxoplasmosis Ocular – Enfermedades infeccionas de la retina – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria




Foto 4 – Toxoplasmosis Ocular – Enfermedades infeccionas de la retina – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria