Se trata de un trastorno de los movimientos oculares, congénito asociado a varios genes defectuosos, en la cual se encuentran los párpados caídos (**ptosis palpebral**) y limitación de todos los movimientos oculares. Generalmente el ojo de encuentra “hundido” (enoftalmos).

La enfermedad no es progresiva y se produce por una sustitución de los músculos que mueven el ojo por bandas fibrosas inelásticas.

Su tratamiento es conservador y en algunos casos se realiza cirugía con resultados limitados.

Imágenes de Fibrosis de los músculos extraoculares



Foto 1 – Paciente con Fibrosis de los músculos extraoculares – Oftalmología

pediátrica y Estrabismo – Dr. Alvaro Sanabria



Foto 2 – Paciente con Fibrosis de los músculos extraoculares – Oftalmología pediátrica y Estrabismo – Dr. Alvaro Sanabria



Foto 3 – Paciente con Fibrosis de los músculos extraoculares – Oftalmología pediátrica y Estrabismo – Dr. Alvaro Sanabria



Foto 4 – Paciente con Fibrosis de los músculos extraoculares – Oftalmología pediátrica y Estrabismo – Dr. Alvaro Sanabria



Foto 5 – Paciente con Fibrosis de los músculos extraoculares – Oftalmología pediátrica y Estrabismo – Dr. Alvaro Sanabria



Foto 6 – Paciente con Fibrosis de los músculos extraoculares – Oftalmología pediátrica y Estrabismo – Dr. Alvaro Sanabria



Foto 7 – Paciente con Fibrosis de los músculos extraoculares – Oftalmología pediátrica y Estrabismo – Dr. Alvaro Sanabria