En esta alteración el **ojo** no se desplaza hacia arriba cuando está mirando hacia adentro, es decir no se completa el movimiento adentro y arriba del globo ocular.

Esto se debe a un trastorno del mecanismo de polea que sirve al músculo oblicuo superior, que impide el desplazamiento del tendón a través de la troclea (Polea).

Trae como consecuencia visión doble (diplopía) al mirar arriba o un **estrabismo** vertical (un ojo más arriba que el otro).

El síndrome de Brown normalmente es de etiología congénita, pero en algunos casos puede ser adquirida por mecanismos inflamatorios. Algunos casos pueden resolverse espontáneamente o con la colocación de antiinflamatorios locales, en otros puede requerir simple observación o **cirugía** cuando induce posiciones compensadoras de cabeza, desviaciones en la mirada al frente o estéticamente es indeseable.

Imágenes de Síndrome de Brown



Síndrome de Brown – Estrabismo – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria



Síndrome de Brown – Estrabismo – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria

Vídeos de Síndrome de Brown

https://oftalmologiapediatrica.com.ve/wp-content/uploads/2018/03/Brown-OI_x264.mp4

Síndrome de Brown (Estrabismos especiales) – Ojo izquierdo – Dr. Alvaro Sanabria – Oftalmología pediátrica – Venezuela.