

El III nervio craneal es un nervio que sale directamente desde el mesencéfalo (Bóveda craneal) e inerva y da movimiento a los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto medio y fibras parasimpáticas de la pupila.

Se altera por varios mecanismos entre ellos la Diabetes mellitus, aneurismas, lesiones intracraneales y traumas.

Su parálisis completa produce [caída del párpado](#), dilatación pupilar, [desviación del ojo](#) hacia adentro y abajo. Ocasiona visión doble y en ocasiones posiciones viciosas de la cabeza.

Requiere evaluación por un neurólogo o neurooftalmólogo.

Su tratamiento depende de la causa y evolución. Sino mejora conservadoramente, requiere [cirugía](#) para mejorar en parte el alineamiento de los [ojos](#), la visión doble y la caída del párpado.

Imágenes de Parálisis del tercer (III) nervio craneal



Foto 1 - Parálisis del tercer (III) nervio craneal - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria



Foto 5 - Parálisis del tercer (III) nervio craneal - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria



Foto 4 - Parálisis del tercer (III) nervio craneal - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria



Foto 3 - Parálisis del tercer (III) nervio craneal - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria



Foto 2 - Parálisis del tercer (III) nervio craneal - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria

Vídeo de Parálisis del tercer (III) nervio craneal

https://oftalmologiapediatrica.com.ve/wp-content/uploads/2018/04/Paresia-III-NC-OD_x264_001.mp4