

Un dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival es un tumor de graso, benigno, blanco amarillento, circunscrito, que se observa en el ángulo superior temporal de la órbita cuando evertimos el párpado.

Tienden a extenderse a la órbita y pueden contener pelos. Su tratamiento es únicamente la observación y en los casos que amerita cirugía, se extirpa únicamente la parte anterior.

Imágenes de Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival

Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival



Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival

Foto 1 - Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria



Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival

Foto 2 - Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria

Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival



Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival

Foto 3 - Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria



Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival

Foto 4 - Dermolipoma de la órbita o lipodermoide conjuntival - Oftalmología pediátrica y Estrabismo - Dr. Alvaro Sanabria